NOTA NATURALISTA

NUEVOS REGISTROS DE SAPO DE PUNTOS ROJOS, *RHINELLA RUBROPUNCTATA*, (GUICHENOT, 1848), EN EL LAGO LANALHUE, REGIÓN DEL BIOBÍO. CHILE.

NEW RECORDS OF RED POINT TOAD, RHINELLA RUBROPUNCTATA, (GUICHENOT, 1848), ON LAKE LANALHUE.

Francisco Rivas F.
Correspondencia a: @hotmail.com

El Sapo de Puntos Rojos, *Rhinella rubropunctata*, es un bufónido endémico de los bosques templados del sur de Chile y Argentina. En Chile, la población se extiende desde el Lago Lanalhue (37° 55´S; 73° 19'W), Provincia de Arauco, hasta Palena, 43°S (aproximadamente). En Argentina, la especie está restringida al sur de la Provincia de Río Negro y el norte de la Provincia de Chubut (incluyendo un registro único del Parque Nacional Los Alerces). Su rango altitudinal comprende desde los 200 hasta los 800 msn (Úbeda et al, 2017).

Según la IUCN, la población nortina de la especie está disminuyendo, mientras las subpoblaciones argentinas parecen ser estables. Es relativamente abundante durante el período reproductivo, cuando se forman los grupos de cortejo.

Habita bosques húmedos, xerófilos y también en ambientes abiertos, algunos de ellos con cierto nivel de perturbación antrópica (Vidoz y Úbeda, 2000).

En diciembre del 2016 encontré accidentalmente un ejemplar de esta especie en un pastizal seco en el sector La Vaina, Lago Lanalhue, comuna de Cañete. El ejemplar se encontraba caminando por la huella de un camino rural. El día anterior había llovido, por lo cual la tierra y el pasto estaban húmedos.

El sitio del avistamiento se caracteriza por ser muy seco, con muy escasa vegetación nativa y abundancia de eucaliptus y zarzamora.

Visité el sitio nuevamente en febrero de 2017, en compañía de Edgardo Flores y Andrés Charrier, sin resultados. En esa oportunidad entrevistamos a un administrador turístico que trabaja en los alrededores del sitio, se le mostró la fotografía tomada el 2016, la que fue identificada por éste como una especie común en la zona, pudiéndose ver todos los años en los pastizales cercanos. Se le pidió avisar cuando avistara nuevamente un ejemplar de la especie. A comienzos de marzo el administrador dio aviso a Andrés Charrier y éste visitó el sitio, constatando el nuevo avistamiento.

Este sitio puede resultar muy importante para la conservación de la especie en el límite norte de su distribución, ya que no setenía registro en esta latitud desde hacía varias décadas. Asimismo, su presencia en un hábitat tan intervenido hace urgente una concientización sobre la protección de nuevos sitios de reproducción de esta especie, en aéreas con escaza presencia de especies de flora nativa.

Bibliografía

Carmen Úbeda, Alberto Veloso, Herman Núñez, Néstor Basso. 2010. *Rhinella rubropunctata*. La Lista Roja de especies amenazadas de la UICN 2010: e.T54751A11199606. Descargado el 28 de Abril de 2017.

Vidoz, F. y C. Úbeda. 2000. *Bufo rubropunctatus* Guichenot en Argentina: registros recientes y nuevos hábitats para la especie. Boletín de la Sociedad de Biología de Concepción 71: 49-52

Imagen 1: Sitio donde se encontró el ejemplar de *Rhinella rubropunctata*.

Imagen 2: Ejemplar de *Rhinella rubropunctata.*